

## Přehledový článek

### Význam ultrazvuku v managementu děložních myomů

### The role of ultrasound in uterine fibroids management

Kristýna Kubínová

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Korespondenční adresa: MUDr. Kristýna Kubínová, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18, 128 00 Praha 2, tel.: +420 224 96 74 20, e-mail: kristynakubinova@gmail.com

Publikováno: 18. 9. 2012

Přijato: 10. 9. 2012

Akceptováno: 11. 9. 2012

Actual Gyn 2012, 4, 72

ISSN 1803-9588

© 2012, Aprofema s.r.o.

Článek lze stáhnout z [www.actualgyn.com](http://www.actualgyn.com)



Citujte tento článek jako: Kubínová K. Význam ultrazvuku v managementu děložních myomů. Actual Gyn. 2012;4:72

Ultrazvuk hraje primární úlohu v diagnostice děložních myomů. Kombinací abdominálního a vaginálního vyšetření jsme schopni získat detailní informace o velikosti, počtu a lokalizaci děložních myomů. Zvláště u pacientek plánujících graviditu je nutný nejenom podrobný popis všech myomů nad 2 cm, ale i posouzení symetrie dutiny děložní.

Dopplerovské vyšetření děložních myomů je nezbytné před indikací ischemizující léčby a posouzení jejího efektu.

Diferenciálně diagnosticky je od děložních myomů třeba odlišit adenomyózu, ovariální patologie a, u pacientek peri/postmenopauzálních s anamnézou rychlého růstu děložního myomu, děložní sarkom. Submukózní myomy mohou být zaměněny za endometriální polyp či karcinom endometria.